

## Differentialgeometrie

Winter-Semester 2014/15

### Übungsblatt 4

18.11.2014

---

#### Aufgabe 1 (Tangentialbündel)

Es sei  $M$  eine glatte Mannigfaltigkeit und  $TM$  das Tangentialbündel von  $M$ .  
Zeigen Sie:

- Die Projektion  $\pi : TM \rightarrow M ; (p, v) \mapsto p$  ist eine Submersion.
- Der Nullschnitt  $\sigma : M \rightarrow TM ; p \rightarrow (p, 0)$  ist eine Einbettung.

#### Aufgabe 2 (Heisenberg-Gruppe)

- Zeigen Sie, dass die Heisenberg-Gruppe

$$H_3(\mathbb{R}) := \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\} \subset \text{Gl}_3(\mathbb{R})$$

eine Lie-Gruppe ist.

- Bestimmen Sie den Tangentialraum  $T_e H_3(\mathbb{R})$  von  $H_3(\mathbb{R})$  mit  $e = I_3$ .  
(Hinweis: Aufgabe 1 auf Blatt 3.)

- Zeigen Sie, dass

$$\mathfrak{h}_3(\mathbb{R}) := \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a & c \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

mit

$$[X, Y] := XY - YX$$

zu einer Lie-Algebra wird.

#### Aufgabe 3 (Riemannsche Isometrien)

- Zeigen Sie, dass ein Diffeomorphismus  $F : (M, g) \rightarrow (N, h)$  zwischen Riemann'schen Mannigfaltigkeiten genau dann eine Isometrie ist, wenn  $F$  die Länge jeder differenzierbaren Kurve  $c : [a, b] \rightarrow M$  invariant lässt:  $L(c) = L(F \circ c)$ .

- b) Zeigen Sie, dass die Isometrien  $F : M \rightarrow M$  einer Riemannschen Mannigfaltigkeit bezüglich der Komposition von Abbildungen eine Gruppe  $\text{Isom}(M)$  bilden. Diese Gruppe heißt *Isometrie-Gruppe* von  $M$ .
- c) Wir betrachten die *hyperbolische Ebene*  $(\mathbb{H}^2, g)$  mit

$$\mathbb{H}^2 := \{z \in \mathbb{C} : \text{Im}(z) > 0\}$$

und der Metrik  $g$ , definiert bzgl. der Karte  $id$  durch

$$(g_{ij}(z)) := \frac{1}{\text{Im}(z)^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zeigen Sie, dass für  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$  mit  $ad - bc = 1$  die Möbius-Transformationen

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}$$

Isometrien von  $\mathbb{H}^2$  sind.