

01.07.2013

Algebraische Zahlentheorie – Übungsblatt 10

Aufgabe 1 (4 Punkte)

Seien G eine endliche Gruppe, H eine Untergruppe und B ein H -Modul. Wir setzen $M_G^H(B) := \{f : G \rightarrow B \mid f(\tau\sigma) = \tau f(\sigma) \forall \tau \in H\}$. Zeigen Sie: Es ist in kanonischer Weise

$$H^i(H, B) \cong H^i(G, M_G^H(B)) \quad \text{für } i = 0, 1.$$

Für die folgenden Aufgaben seien n eine natürliche Zahl und K ein Körper mit $\text{char} K \nmid n$ und $\mu_n \in K^\times$.

Aufgabe 2 (4 Punkte)

Sei $\Delta \leq K^\times$ mit $(K^\times)^n \leq \Delta$. Zeigen Sie: Die Kummer-Erweiterung $K(\sqrt[n]{\Delta})$ über K ist galoissch mit abelscher Galoisgruppe G vom Exponenten n .

Aufgabe 3 (4 Punkte)

Sei $\{F_i\}_{i \in I}$ eine Familie von Kummer-Erweiterungen des Körpers K in einem festen algebraischen Abschluss und sei F das Kompositum aller F_i . Zeigen Sie: F/K ist ebenfalls eine Kummer-Erweiterung.

Aufgabe 4 (4 Punkte)

Zeigen Sie, dass $\tilde{K} := K(\sqrt[n]{K^\times})$ die maximale Kummer-Erweiterung von K ist mit

$$K^\times / (K^\times)^n \cong \text{Hom}(\text{Gal}(\tilde{K}/K), \mu_n).$$

Abgabe: Bis Montag, den 08.07.2013, vor Beginn der Übung an die Übungsleiterin.