

Höhere Mathematik für Informatiker I (Analysis)

13. Übungsblatt

Abgabe von 2 K-Aufgaben bis Freitag, 5.2.2010, 12.30 Uhr

K 49. Es sei f ein Polynom mit komplexen Koeffizienten, d.h. $f(z) := c_0 + c_1z + \dots + c_nz^n$, $c_0, \dots, c_n \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$. Ferner existiere ein $r > 0$ mit folgender Eigenschaft:

$$z \in \mathbb{C}, |z| \leq r \Rightarrow |f(z)| \leq |f(0)|.$$

Beweisen Sie, dass dann $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ gilt, d.h. dass f konstant ist.

K 50.

(a) Beweisen Sie die Orthogonalitätsrelationen ($n, k \in \mathbb{N}$):

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \cos(kx) dx &= 0, \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \sin(kx) dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(kx) dx = \begin{cases} \pi & : k = n \\ 0 & : k \neq n \end{cases} \end{aligned}$$

(b) Berechnen Sie die Fourierkoeffizienten der 2π -periodischen Funktion f , welche auf $(-\pi, \pi]$ durch $f(x) = |x|$ ($x \in (-\pi, \pi]$) definiert ist.

51. Beweisen Sie die Identität

$$\frac{1}{2} + \cos x + \dots + \cos(nx) = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})x)}{2 \sin(\frac{1}{2}x)} \quad (x \in \mathbb{R}, x \neq 2\pi m, m \in \mathbb{Z})$$

und leiten daraus Sie die Darstellung

$$s_n(f)(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \frac{\sin((n + \frac{1}{2})(t - x))}{2 \sin(\frac{1}{2}(t - x))} dt$$

für die n -te Partialsumme

$$s_n(f)(x) := \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$$

der Fourierreihe von f her. Dabei genüge f der Voraussetzung (V) aus der Vorlesung. Hinweis: Additionstheoreme für \sin, \cos benutzen.

52. Es sei $f(z) := c_nz^n + \dots + c_0$ ein Polynom mit komplexen Koeffizienten ($n \in \mathbb{N}$, $c_n \neq 0$) und R derart, dass

$$R \geq 1, \quad \frac{1}{R} \left(\frac{|c_{n-1}|}{|c_n|} + \dots + \frac{|c_0|}{|c_n|} \right) \leq \frac{1}{2}$$

gilt. Zeigen Sie: es gilt

$$|f(z)| \geq \frac{1}{2} |c_n| |z|^n \quad (z \in \mathbb{C}, |z| \geq R).$$

Können Sie eine obere Schranke für die Beträge sämtlicher Nullstellen von f angeben?