

Höhere Mathematik für Informatiker I (Analysis)

15. Übungsblatt (Ferienübungsblatt)

Zur weiteren Einübung des Stoffes, keine Abgabe

57. Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und (a_n) eine Folge mit $a_n \in [a, b]$ ($n \in \mathbb{N}$). Zeigen Sie:

$$f(\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} f(a_n).$$

58. Die Funktionen $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ seien stetig auf $[a, b]$ und differenzierbar auf (a, b) . Beweisen Sie: es gibt ein $x \in (a, b)$ derart, dass

$$f'(x)(g(b) - g(x)) = (f(x) - f(a))g'(x).$$

Hinweis: Satz von Rolle.

59. Es sei $p(z) := a_0 + a_1z + \dots + a_nz^n$ ein Polynom mit reellen Koeffizienten. Zeigen Sie: Es gibt reelle Zahlen x_1, \dots, x_r mit $p(x_j) = 0$ und $\rho_1, \dots, \rho_r, \sigma_1, \dots, \sigma_s \in \mathbb{N}$ derart, dass

$$p(x) = a_n(x - x_1)^{\rho_1} \dots (x - x_r)^{\rho_r} (x^2 + A_1x + B_1)^{\sigma_1} \dots (x^2 + A_sx + B_s)^{\sigma_s} \quad (x \in \mathbb{R})$$

gilt, wobei die Polynome $(x^2 + A_jx + B_j)$, $j = 1, \dots, s$ untereinander verschieden sind und keine reellen Nullstellen besitzen. Hinweis: Ist z eine Nullstelle von p , so ist \bar{z} ebenfalls eine Nullstelle von p . Benutzen Sie den Fundamentalsatz der Algebra.

60. Der Satz über die *Partialbruchzerlegung* lautet folgendermaßen: es seien p, q reelle Polynome, wobei der Grad von q echt größer sei als der Grad von p . Ferner sei

$$q(x) = a_n(x - x_1)^{\rho_1} \dots (x - x_r)^{\rho_r} (x^2 + A_1x + B_1)^{\sigma_1} \dots (x^2 + A_sx + B_s)^{\sigma_s} \quad (x \in \mathbb{R})$$

gemäß Aufgabe 59. Dann besitzt die gebrochenrationale Funktion $r(x) := p(x)/q(x)$ die Darstellung

$$r(x) = \sum_{j=1}^r \left[\frac{a_{j1}}{x - x_j} + \frac{a_{j2}}{(x - x_j)^2} + \dots + \frac{a_{j\rho_j}}{(x - x_j)^{\rho_j}} \right] + \sum_{i=1}^s \left[\frac{\alpha_{i1}x + \beta_{i1}}{x^2 + A_ix + B_i} + \dots + \frac{\alpha_{i\sigma_i}x + \beta_{i\sigma_i}}{(x^2 + A_ix + B_i)^{\sigma_i}} \right] \quad (x \in \mathbb{R}, x \neq x_j, j = 1, \dots, r).$$

Bestimmen Sie die Partialbruchzerlegung der folgenden gebrochenrationalen Funktionen:

(a) $\frac{x^2+1}{x^5+2x^4+2x^3+x^2}$

(b) $\frac{x+2}{x^6+x^4-x^2-1}$

61. Verifizieren Sie folgenden Formeln der unbestimmten Integration. Hierbei sei vorausgesetzt, dass das Polynom $x^2 + ax + b$ keine reellen Nullstellen besitzt.

$$\int \frac{dx}{x^2 + ax + b} = \frac{2}{\sqrt{4b - a^2}} \arctan \frac{2x + a}{\sqrt{4b - a^2}}$$

$$\int \frac{dx}{(x^2 + ax + b)^m} = \frac{2x + a}{(m - 1)(4b - a^2)(x^2 + ax + b)^{m-1}} + \frac{2(2m - 3)}{(m - 1)(4b - a^2)} \int \frac{dx}{(x^2 + ax + b)^{m-1}} \quad (m \geq 2)$$

$$\int \frac{\alpha x + \beta}{x^2 + ax + b} = \frac{1}{2} \log(x^2 + ax + b) + (\beta - \alpha a/2) \int \frac{dx}{x^2 + ax + b}$$

$$\int \frac{\alpha x + \beta}{(x^2 + ax + b)^m} = -\frac{\alpha}{2(m - 1)(x^2 + ax + b)^{m-1}} + (\beta - \alpha a/2) \int \frac{dx}{(x^2 + ax + b)^m} \quad (m \geq 2)$$

Eräutern Sie den Zusammenhang mit der Partialbruchzerlegung.

62. Berechnen Sie die folgenden Integrale:

$$\int \frac{x^2 + 3}{x^2 - 1} dx, \quad \int_3^4 \frac{-2x^2 + x - 3}{(x + 1)(x - 1)(x - 2)} dx, \quad \int_{9/8}^{4/3} \sqrt{\frac{x}{x - 1}} dx, \quad \int \frac{dx}{(x^2 + x + 1)^2}$$

63.

(a) Zeigen Sie: $\int_0^\pi \frac{\sin((n+1/2)t)}{\sin(t/2)} dt = \pi$ (Hinweis: Aufgabe 51).

(b) Es sei

$$g(t) := \frac{2}{t} - \frac{1}{\sin(t/2)} \quad (t \in (0, \pi]), \quad g(0) = 0.$$

Zeigen Sie, dass $g \in R[0, \pi]$ gilt.

(c) Folgern Sie aus (a) und (b), dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{\sin((n + 1/2)t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

gilt (Hinweis: Satz von Riemann-Lebesgue).

(d) Zeigen Sie: $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$ (Hinweis: Aufgabenteil (c)).

WIR WÜNSCHEN IHNEN EINE ERHOLSAME VORLESUNGSFREIE ZEIT