

Höhere Mathematik für Informatiker I (Analysis)

2. Übungsblatt

Abgabe von 2 K-Aufgaben bis Freitag, 6.11.2009, 12.30 Uhr

K 5.

(a) Zeigen Sie: $\prod_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = \frac{n^n}{n!}$ für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$.

(b) Zeigen Sie: es gilt $\frac{1}{2^n} < \frac{1}{n}$ für alle $n \in \mathbb{N}$. *Hinweis:* Bernoulli-Ungleichung.

(c) Berechnen Sie $\sum_{k=1}^n (-1)^k k \binom{n}{k}$ für $n \in \mathbb{N}$.

6. Zeigen Sie

(a) Sind X, Y abzählbare Mengen, so ist

$$X \times Y := \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$$

ebenfalls abzählbar (*Hinweis:* ähnlich wie \mathbb{Q}).

(b) Sind A_1, A_2, \dots abzählbar viele abzählbare Mengen, dann ist

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n := \{a : \exists n \in \mathbb{N} : a \in A_n\}$$

ebenfalls abzählbar.

(c) Die Menge aller Teilmengen von \mathbb{N} mit endlich vielen Elementen ist abzählbar.

K 7. Zeigen Sie, daß diese Folgen konvergieren, und berechnen Sie den Grenzwert.

(a) $a_n = \frac{(n+1)^2}{n} - n$

(b) $b_n = \frac{1+3+\dots+(2n-1)}{1+2+\dots+n}$

(c) $c_n = 2\sqrt{n}(\sqrt{n+2} - \sqrt{n})$

(d) $d_n = \sqrt[3]{n^3 + 6n^2} - n$

8.

(a) Es sei (a_n) eine Nullfolge. Zeigen Sie:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Hinweis: Fixieren Sie $\varepsilon > 0$, wählen Sie $m \in \mathbb{N}$ geeignet, machen Sie die Zerlegung

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^m a_k + \frac{1}{n} \sum_{k=m+1}^n a_k$$

und wählen Sie dann n_0 geeignet.

(b) Zeigen Sie: Aus $a_n \rightarrow a$ ($n \rightarrow \infty$) folgt $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \rightarrow a$ ($n \rightarrow \infty$).