

Höhere Mathematik II

SS 2007

Aufgaben zur 1. Übung (20.4.07)

① Es sei  $I \subseteq \mathbb{R}$ ,  $I \neq \emptyset$  ein Intervall,  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ ,  
sowie  $f, g \in C(I)$ .

Differentialgleichungen der Form  $y' + f(x) \cdot y = g(x) y^\alpha$   
werden Bernoulli'sche Differentialgleichungen genannt.

Eine Möglichkeit, diese zu lösen, wurde in der Vorlesung vorgestellt.

Andere Möglichkeit: Nach dem Ansatz  $z(x) = (y(x))^{1-\alpha}$

$$\text{Dann ist } y(x) = (z(x))^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

(Achtung: evtl. Vorzeichenbetrachtungen für  $y(x)$  notwendig.)

Damit erhält man

$$y' = \frac{1}{1-\alpha} z^{\frac{1}{1-\alpha}-1} \cdot z' = \frac{1}{1-\alpha} z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot z'$$

Einsetzen in die Differentialgleichung ergibt

$$\frac{1}{1-\alpha} z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot z' + f(x) z^{\frac{1}{1-\alpha}} = g(x) \cdot z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

und somit

$$\frac{1}{1-\alpha} z^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot [z' + (1-\alpha) f(x) z - (1-\alpha) g(x)] = 0$$

Löst man die triviale Lösung  $y(x) = 0$  ab, so gilt, dass  
es Intervalle, in denen  $z(x) \neq 0$  gilt, und man  
muss dann die inhomogene lineare Dgl.

$$z' + (1-\alpha) f(x) z = (1-\alpha) g(x) \quad \text{l\u00f6se.}$$

Durch Substitution erh\u00e4lt man dann die allgemeine L\u00f6sung der Bernoulli'schen Dgl.

② Noch ein Dgl. typ: Differentialgleichungen der Form

$$y' = a(x) + b(x)y + c(x)y^2$$

mit Koeffizientenfunktionen  $a, b, c$ , die in einem gemeinsamen Intervall stetig sind, werden Riccati'sche Dgln. genannt.

(Hierbei wird  $a=0$  oder  $c=0$  angeschaut, da

$a=0$  : Bernoulli-Dgl.,  $c=0$  : lineare Dgl.)

In allgemeinen sind L\u00f6sungen dieser Dgl. nicht in geschlossener Form darstellbar.

Ist jedoch eine L\u00f6sung  $y_1(x)$  bekannt, dann f\u00fchrt man die Substitution

$$y(x) = y_1(x) + \frac{1}{u(x)} \quad \text{durch.}$$

Geht man mit

$$y'(x) = y_1'(x) - \frac{u'(x)}{(u(x))^2}$$

in die Riccati'sche Dgl. ein, so erh\u00e4lt man

$$\underline{y_1'} - \frac{u'(x)}{(u(x))^2} = \underline{a(x)} + \underline{b(x)y_1(x)} + b(x) \frac{1}{u(x)}$$

$$+ \underline{c(x)(y_1(x))^2} + 2c(x) \frac{y_1(x)}{u(x)} + c(x) \frac{1}{(u(x))^2} \quad |$$

und, da  $y_1$  die Dgl erfüllt, samt nach Multiplikation mit  $(u(x))^2$ :

$$(*) \quad u' + b(x)u + 2c(x)y_1(x)u + c(x) = 0$$

Dies ist eine inhomogene lineare Dgl.

Man kann zeigen, dass sich alle Lösungen der Riccati'schen Dgl schreiben lassen als

$$y(x) = y_1(x) + \frac{1}{u(x)} \quad (\text{oder } y(x) = y_1(x)),$$

wobei  $u$  die Lösungen der Dgl. (\*) durchläuft.

(Insbesondere ist dies unabhängig von der speziellen Lösung  $y_1$ .)

③ Bestimmen Sie sämtliche Lösungen des Dgl

$$\begin{matrix} (*) \\ (*) \end{matrix} \quad y' = -x^2 - \frac{1}{2}x + 1 + (2x + \frac{1}{2})y - y^2.$$

Lösung: Es handelt sich um eine Riccati'sche Dgl.

Da die Koeffizientenfunktionen Polynome sind, macht man zur Bestimmung einer speziellen Lösung einen Polynomansatz. Vergleicht man die dann auftretenden  $x$ -Potenzen, stellt man fest, dass nur ein Polynom ersten Grades in Frage kommt.

Geht man mit dem Ansatz  $y(x) = ax + b$  in die Dgl. ein, so erhält man

$$(-a^2 + 2a - 1)x^2 + (-2ab + \frac{1}{2}a + 2b - \frac{1}{2})x - b^2 + \frac{1}{2}b + 1 - a = 0.$$

Wie man sieht, kann diese Bedingung nur für

$$a=1 \quad , \quad b=0 \quad \text{oder} \quad b=\frac{1}{2} \quad \text{erfüllt sein.}$$

Mittels Einsetzen bestätigt man, dass die Polynome

$$y_1(x) = x \quad , \quad y_2(x) = x + \frac{1}{2} \quad \text{spezielle Lösungen}$$

des Dgl. sind.

Um Rechenarbeit zu sparen, verwendet man die Lösung  $y_1(x) = x$ .

Die Substitution  $y(x) = x + \frac{1}{u(x)}$  ergibt dann gemäß

der Gleichung (\*) von ② die lineare Dgl.

$$u' = -\frac{1}{2}u + 1$$

mit der allgemeinen Lösung

$$u(x) = C e^{-\frac{1}{2}x} + 2 \quad (C \in \mathbb{R})$$

Also ist

$$y(x) = x + \frac{1}{C e^{-\frac{1}{2}x} + 2} \quad (C \in \mathbb{R})$$

die allgemeine Lösung der Riccati-Dgl.

(Bemerkung: Die spezielle Lösung  $y_1(x) = x$  hilft man formel für  $C \rightarrow \infty$ .)